

## Újabb beszámoló tartós gyógyulások ól ozaenás betegeken

Írta: Falta László dr.

Intézetünkben évek óta több irányú terápiás kísérleteket folytatunk az ozaena gyógyítására. Így Görgényi előbb *Bánhidyval* és *Halász-szal* közösen, később önállóan Filatov szerint kezelt adenoid szövet orrnyálkahártya alá végzett transplantiójával ért el jó eredményeket. Ezekről az 1950., illetőleg 1955. évi Fül-orr-gége nagygyűlésen számolt be.

Magam e lap hasábjain hét év előtt számoltam be ozaenás betegeken végzett gyógyeljárásai kísérletekről. Most a véletlen rávezetett, hogy a sikerrel kezelt esetek nagyrésztében végleges gyógyulás következett be. Ugyanis hónapokkal ezelőtt felkeresett B. L-né 48 éves, tizenegy év előtt kezelt Szeged környéki nőbetegem és legmélyebb hálaérzetét nyilvánította, hogy milyen szörnyű betegségtől szabadult meg, melyben *gyermekkorá óta* szenvedett. A penetráns bűzt és a nagytömegű pörkképződéssel járó ozaenát semmilyen más eljárás (orröblítés, orrcsetelés, vaccina stb.) nem befolyásolta. Emiatt házassági válságba került. A gyógyítást 1946-ban kezdtük. Hetenként háromszor kapott 1 ml 2%-os Azulenol-injectiót intraglutealisan, összesen 15-öt egy sorozatban. — Két hónapi szünet után ismét 15 injectiót, 2—2 havi időközökben összesen 60-at. — Azóta, tehát tizenegy éve, semmilyen orrkezelést nem kapott. 3—4 naponként használ egy zsebkendőt, pörknek vagy foetornak nyoma sincsen, kisebb mértékben a szagérzete is visszatért. A legfrappánsabb lelet pedig a tizenegy év utáni kontroll alkalmával, hogy az orr nyálkahártyája *teljesen regenerálódott*. Az orrnyálkahártya normális, középvastagságú, halvány rózsaszínű. Tág orrüregnek, vagy sorvadtt orrképleteknek nyoma sincsen.

Az említett eset után sikerült hosszú évek múlva még 5 beteget kontrollálni. Ezek azok közül kerültek ki, akik előző közleményemben már a sikerrel kezelt betegek csoportjához tartoztak. Ezeknél is *tökéletes gyógyulást észleltünk* 7, 8, 9 évvel a kezeléseik befejezése után. Csupán egy betegen kisebb mértékű pharyngitis sicca és a szagérés csökkent volt árulta el a régi, más eljárásra nem gyógyuló ozaena nyomait.

Hivatkozott közleményemben jeleztem, hogy az Azulenolt előállítója, *Jancsó* asthma bronchiale, urticaria, allergiás colitisek, chronicus ízületi csúz és izomrheumatismus eseteiben alkalmazta. Ozaenás betegeken én kezdtem először 1946-ban terápiás kísérleteket Azulenolla. Ez az anyag a szövetekben histamint szabadít fel, mely a sejtek phagocyta-tevékenységére kiváló hatást gyakorol. A kiserek endothelsejtjei histamin hatására reticulo-endothel sejtekké alakulnak át. Ezek azután részt vesznek a kórokozók felfalásában és elpusztításában. A gyógyszergyár különböző okok folytán a gyártást 1955-ben beszüntette.

Természetesen minden általunk kezelt beteg orrváladéka „Klebsiella ozaena”-ra pozitív volt, mint azt előző közleményemben jeleztem. Amennyiben az 5—6-ik injectióra határozott javulás, foetor és pörkképződés csökkenése stb. nem mutatkozott, a kúra folytatását céltalannak tartottuk.

Az injectiókat hetenként háromszor kell adni, összesen 15-öt. Két-két havi



szünet után újból 15-öt. Egyeseknél 30 injectio elég, ha régi ozaenáról van szó, mint fentebb jeleztük, összesen 45—60 injectióra van szükség, pl. az első B. L-né betegnél. *A kúra alatt a betegek semmilyen más gyógyszert nem kaphatnak.* Az eredmény megítélése érdekében mellőzendő egyéb helyi kezelés is.

A gyógyszergyár tudományos osztályával még 1949-ben összeköttetést szerezünk, mely a későbbiekben a chemazulent ciklofarkkóróból állította elő. Tapasztalatunk szerint ez nagyban fokozta a szer hatásosságát. Az Azulenol nagy előnye, hogy az injectiók egyáltalán nem fájdalmasak. A betegek ambulánsan kezelhetők és a kezelés tartama alatt is munkahelyükön nyugodtan dolgozhatnak. A befecskendezések a legkisebb melléktünetet sem okozzák, a szervezetre káros hatással nincsenek. Ezekről tanúskodnak tíz év után ellenőrzött eseteink is. A részünkre hozzáférhető világirodalomban eddig említett legkülönbözőbb eljárásokkal (műtétek, transplantatiók, vaccinák, különböző gyógyszerek) ilyen eredményről még nem számoltak be. A más eljárásokkal gyógyított és általunk észlelt betegek nagy része másfél- két év múlva újra rosszabbodott. — A közöltek alapján kívánatos volna, ha a gyár az Azulenol készítését újból elkezdene.

#### Összefoglalás:

1950-ben megírt és ozaenás betegeken végzett gyógyeljárási kísérleteket kontrolláltuk. Ezek szerint egyes ozaenás betegeken Azulenollal tartós és fel-tűnő javulás érhető el.

#### IRODALOM

*Campion—Kállay:* Mschr. Ohrenh. Jg. 76. H. 8. — *Cesinszkij A. J.:* Vestnik. Otol. 1949. 6. — *Denker—Kahler:* Handbuch der Hals-, Nasen- u. Ohrenh. — *De Reynier:* Pract. O'orhino-laryng. Vol. IX. Fasc. 1. — *Falta L.:* Honvéderos 1951. 1. — *Görgényi—Bánhidu—Halász:* Fül-orr-egye nagygyűlés 1950. — *Görgényi:* Fül-orr-egye nagygyűlés. 1955. — *Halász:* Mschr. Ohrenh. Jg. 73. H. 5. — *Jancsó M.:* Orvosok Lapja 1947. III. évf. 28. sz. — *Meier és Bucher:* Schweiz. Med. Wschrift: 1946. 294. — *Pesti:* Mschr. Ohrenh. Jg. 82. H. 4. — *Popper:* Mschr. Ohrenh. Jg. 83. H. 10—11—12. — *Soskin:* Zbl. f. HNO. Bd. 35 H. 11.

*Л. Фальта:*

#### НОВЫЙ ОТЧЕТ О ДЛИТЕЛЬНОМ ВЫЗДОРОВЛЕНИИ ОЗЕНОЗНЫХ БОЛЬНЫХ

Проверились описанные в 1950 г. эксперименты лечебных способов у озенoзных больных. Согласно полученным данным с помощью Азуленола можно вызывать длительное поразительное улучшение в состоянии некоторых озенoзных больных.

*Dr. L. Falta*

#### NEUERER BERICHT ÜBER DAUERHEILUNGEN BEI DER OZAENA

Unsere 1950 durchgeführten und beschriebenen therapeutischen Versuche wurden nachkontrolliert, wobei die Feststellung gemacht werden konnte, dass bei einigen Ozaena-Kranken auffällige definitive Heilung erzielt werden kann.